

Změny platné od 13.5.2010

Pořadí dle SIH pro býky a krávy (plemeno H)

- U býků se pořadí dle SIH přiděluje těm jedincům, kteří splňují podmínky pro zařazení do TOP. Toto pravidlo zůstává platné i nadále. Doposud se však pořadí určovalo podle hodnoty SIH, a dále podle spolehlivosti a počtu stád na produkci. Na základě dohody se Svazem chovatelů holštýnského skotu bude od 13.5.2010 pořadí dle SIH určováno pouze podle hodnoty SIH. V případě, že 2 a více býků bude mít shodnou hodnotu SIH, bude se shodovat i jejich pořadí.
- U krav se pořadí dle SIH-K přiděluje prvním 1500 plemenicím seřazeným podle hodnoty SIH-K, které zároveň splňují podmínky pro zařazení do TOP. Toto pravidlo zůstává platné i nadále. Od 13.5.2010 budou mít plemence v sestavě TOP dle SIH-K, stejně jako býci, shodné pořadí, pokud budou mít stejnou hodnotu SIH-K.

Aktualizace průměrných užitkovostí používaných při stanovení PH složek (plemeno C)

- Na žádost Svazu chovatelů českého strakatého skotu byla ve výpočtu PH mléčné produkce pro plemeno C provedena aktualizace hodnot laktačních průměrů, které se používají při výpočtu PH % tuku a PH % bílkovin. (Bližší informace o výpočtu PH složek viz odkaz „Metodiky stanovení PH“ na www.plemdat.cz.)

Nové fenotypové průměry pro stanovení PH složek u plemene C					
	Kg mléka	Kg tuku	Kg bílkovin	% tuku	% bílkovin
1. laktace	5862	240	203	4,09	3,47
2. laktace	6676	267	230	4,00	3,44
3. a další	6772	269	230	3,98	3,39

RPH masa ve výpočtu SIC bez předchozí standardizace (plemeno C)

- RPH masné užitkovosti, které jsou počítány ve společném hodnocení v Německu, vstupovaly doposud do výpočtu SIC upravené standardizací na ročník narození 1995 s parametry (100; 12). Od 13.5.2010 budou RPH masa vstupovat do výpočtu SIC bez této úpravy.
- Ze sestavy TOP dle SIC budou tedy odstraněny sloupce nadepsané NP-CZ, JT-CZ, JV-CZ. V příslušných sestavách se navíc změní názvy sloupců NP-DE, JT-DE, JV-DE na NP, JT, JV.